

# DOFEBRIL 500 mg<sup>®</sup>

## Paracétamol

### Boîte de 20 comprimés effervescents

#### Composition :

- Paracétamol ..... 500mg
- Excipients : Q.S.P ..... 1 comprimé

#### Indication :

DOFEBRIL est un antalgique et antipyrétique indiqué pour

- Les maux de tête, maux de dents
- Pour les états fébriles, courbatures, états grippaux et affections douloureuses.

#### Posologie et mode d'administration :

Adulte et enfants âgés plus de 15 ans :

1 à 2 comprimés par prise, 1 à 3 fois par jour sans dépasser une dose quotidienne de 3g

Enfants :

De 7 à 13 ans : ½ comprimé à 1 comprimé, 3 à 4 fois par jour.

Enfants de 13 à 15 ans : 1 comprimé par prise, sans dépasser 6 comprimés par jour.

Espacer les prises de 4 à 6 heures.

Dissoudre le comprimé dans un demi verre d'eau.

#### Contre Indications :

- Allergie au paracétamol.
- Maladie hépatique grave.
- Sujets atteints de calculs rénaux.
- Alcoolisme chronique.

#### Effets Indésirables :

- Des réactions allergiques type eczéma, urticaire peuvent apparaître et demandent l'interruption immédiate du

médicament

- Exceptionnellement, des thrombopénies peuvent apparaître

#### Précautions d'emploi :

- En cas de régime désodé, tenir compte dans l'apport quotidien de la présence du sodium
- En cas de maladie du foie, consultez votre médecin avant de prendre ce médicament.
- En cas d'une clairance rénale diminuée, espacer les prises de 6 heures et ne pas dépasser une dose quotidienne de 3 comprimés.

#### Grossesse et allaitement :

- DOFEBRIL peut être utilisé chez la femme enceinte ou allaitante.
- Cependant, il convient toujours de demander l'avis de votre médecin ou pharmacien avant de prendre un médicament.

#### Présentation :

Boîte de 20 comprimés effervescents

**Ne pas laisser à la portée des enfants**

Notice rédigée 2006



ALGERIAN PHARMACEUTICAL INSTITUTE  
Zone Industrielle EL Tarf El khroub - Constantine

# دوفبريل 500 مغ<sup>®</sup>

براسيتامول

علبة 20 قرص فوار

**التركيب :**

براسيتامول ..... 500 مغ

سواغ ك ل ك ل ..... قرص واحد

**دواعي الإستطباب :**

دوفبريل مضاد للحمى و الألم يستعمل في حالات

- آلام الرأس و الأضراس

حالات الحمى،التشنجات، حالات الزكام و الألم

**المقادير و طريقة الاستعمال :**

الكبار و الأطفال الأكبر من 15 سنة

قرص الى قرصين في الجرعة ، دون تعدي جرعة يومية

3 غرامات

الأطفال

من 7 الى 13 سنة : 1/2 قرص الى قرص 3 الى 4 مرات

في اليوم.

من 13 الى 15 سنة : قرص في الجرعة ، دون تعدي 6

أقراص في اليوم.

تباعد الجرعات من 4 الى 6 ساعات

يذوب القرص في نصف كأس ماء

**مضادات الاستطباب :**

- حساسية للبراسيتامول

- امراض الكبد

- الأشخاص المصابين بحصى الكلى

- مدمني الكحول

**التأثيرات غير المرغوب فيها:**

حالات حساسية كالاكزيما و الحكاك تظهر و توجب إيقاف

الدواء حتما

أحيانا يمكن ظهور نقص في الصفائح الدموية

**احتياطات الاستعمال :**

في حالة حمية دون ملح ، يرجى الأخذ بعين الاعتبار وجود

الصدويوم في الجرعة اليومية

في حالة مرض كبدي يستحب مراجعة الطبيب قبل تناول

هذا الدواء

في حالة مرض كلوي ، يرجى تباعد الجرعات بـ 6 ساعات و

عدم تجاوز جرعة يومية بـ 3 أقراص

**الحمل و الرضاعة :**

دوفبريل يستعمل للمرأة الحامل و المرضعة انما من باب

الاحتياط، يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول

أي دواء

**العبوة :**

علبة تحوي 20 قرص فوار

**لا يترك في متناول الأطفال**